

Primer avstralske in ameriške raziskave, ki je vključevala prek 220.000 rakavih bolnikov v časovnem obdobju med 1990 in 2004. Originalni članek: Morgan G., Wardy R., Bartonz M. The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies, *Clinical Oncology*, 16, 2004, p. 549-560.

Učinkovitost kemoterapije za zdravljenje raka v Avstraliji

Bolezen/lokacija tumorjev	Število bolnikov nad 20 let	Absolutno število preživelih nad 5 let	Odstotki preživelih nad 5 let po kemoterapiji
Glava in zatilje	2486	63	2,5
Požiralnik	1003	54	4,8
Želodec	1904	13	0,7
Debelo črevo	7243	128	1,8
Danka	4036	218	5,4
Pankreas	1728	0	0
Pljuča	7792	118	1,5
Sarkom mehkih delov	665	0	0
Melanom kože	7811	0	0
Prsi	10661	164	1,5
Maternica	1399	0	0
Maternični vrat	867	104	12
Jajcevod	1207	105	8,7
Prostata	9869	0	0
Moda	529	221	41,8
Mehur	2802	0	0
Ledvice	2176	0	0
Možgani	1116	55	4,9
Neznan primarni tumor	3161	0	0
Ne-Hodgkinov limfom	3145	331	10,5
Morbus Hodgkin	341	122	35,8
Multipli mielom	1023	0	0
skupaj	72.903	1690	2,3%

Učinkovitost kemoterapije za zdravljenje raka v ZDA

Bolezen/lokacija tumorjev	Število bolnikov nad 20 let	Absolutno število preživelih nad 5 let	Odstotki preživelih nad 5 let po kemoterapiji
Glava in zatilje	5139	97	1,9
Požiralnik	1521	82	4,9
Želodec	3001	20	0,7
Debelo črevo	13936	146	1,0

Danka	5533	189	3,4
Pankreas	3567	0	0
Pljuča	20741	410	2,0
Sarkom mehkih delov	858	0	0
Melanom kože	8646	0	0
Prsi	31133	446	1,4
Maternica	4611	0	0
Maternični vrat	1825	219	12
Jajcevod	3032	269	8,9
Prostata	23242	0	0
Moda	989	373	37,7
Mehur	6667	0	0
Ledvice	3722	0	0
Možgani	1824	68	3,7
Neznani primarni tumor	6200	0	0
Ne-Hodgkinov limfom	6217	653	10,5
Morbus Hodgkin	846	341	40,3
Multipli mielom	1721	0	0
skupaj	154.971	3306	2,1%